



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Aplikace Warfarinu

Vypracovala : Mgr. Iva Holemářová

Warfarin

- Indikační skupina : antikoagulancium
- Indikace : prevence TEN, TEN at PULM.
: flebotrombóza
- Druhy : Warfarin 1,3,5 mg
- Kontrolní odběr : INR (Quick)
normohodnota 0,8–1,2
u Warfarinizovaných 2–3
- Antidotum : vitamín
K – Kanavit




Edukace pacienta


- Warfarin užívat dle ordinace lékaře, nevysazovat !!!
- pravidelně navštěvovat antikoagulační poradnu, kontrola INR
- nosit s sebou průkazku a hlásit, že užívá Warfarin
- omezit ve stravě vitamín K – listová zelenina, kuřecí maso, vnitřnosti , sójový, olivový olej, bylinné čaje

- sledovat krvácivé projevy – epistaxe, hematomy, hematurii, krvácení z dásní, z konečníku
- neužívat antiagregancia –např. Ibalgin
- v těhotenství přechod na nízkomolekulární hepariny– Clexane, Fraxyparine

Informace pro sestru

- pravidelně dávkovat Warfarin dle ordinace lékaře
 - odebírat krev na INR dle ordinace lékaře
 - sledovat krvácivé projevy, při jejich výskytu informovat lékaře
 - podávat warfarinovou dietu (s omezením listové zeleniny)
 - neaplikovat i.m. injekce
 - edukovat pacienta
- 

Modelové situace

- Lékař naordinoval 7,5 mg Warfarinu . Kolik tablet Warfarinu podáš pokud máš Warfarin 3mg a 5mg ?
 - Lékař naordinoval 6 mg Warfarinu. Jaký zvolíš typ Warfarinu (3mg,5mg) a kolik tablet podáš ?
 - Pacient užívající Warfarin začal krvácet z nosu, jak poskytneš první pomoc a co je tvou povinností ?
- 

Zdroje:

- ▶ **KELNAROVÁ, J. a kolektiv, Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy – 2.ročník, 1. díl, 1. vydání, Praha: GRADA Publishing, 2009. ISBN 978–80–247–3105–6**

Název školy: **SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou**

Číslo projektu: **CZ.1.07/1.5.00/34.0328**

Název materiálu: **Podávání léků**

Vyučovací předmět: **Ošetřovatelství**

Datum tvorby: **2012/2013**