



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní list č. 8

TEST: Podávání léků - injekce, příprava injekcí, intradermální injekce

1. Injekce je:

- a, vpravení látky do organismu injekční stříkačkou a jehlou
- b, vpravení sterilních roztoků do organismu injekční stříkačkou a jehlou
- c, podání léčebné látky parenterálně
- d, podání tekutiny do organismu injekční stříkačkou a jehlou

2. Diagnostickým účelem injekce je:

- a, aplikace očkovací látky
- b, aplikace kontrastní látky
- c, aplikace léčebné látky
- d, zneškodnění toxické látky v organismu

3. Preventivním účelem injekce je:

- a, aplikace očkovací látky
- b, aplikace kontrastní látky
- c, aplikace léčebné látky
- d, zneškodnění toxické látky v organismu

4. Zkratka i.d. znamená aplikaci:

- a, do žíly
- b, do tepny
- c, do svalu
- d, do kůže

5. Zkratka s.c. znamená aplikaci:

- a, do svalu
- b, do žíly
- c, do kůže
- d, pod kůži

6. Intrakardiální aplikace je aplikace:

- a, do kloubu
- b, do tepny
- c, do srdce
- d, do páteřního kanálu

7. Intraartikulární aplikace je aplikace:

- a, do kloubu
- b, do tepny
- c, do srdce
- d, do páteřního kanálu

8. Jak dlouho kontrolujeme pacienta po aplikaci injekce?

- a, 10 minut
- b, 20 minut

c, 30 minut

d, 1 hodinu

9. Pokud nepoužiji celý lék z ampulky zbytek léku:

a, uchovám pro jiného pacienta

b, znehodnotím

c, dám do lednice

d, vrátím mezi ampulky a označím datem expirace

10. K ředění léku v lahvičce používám:

a, Glukózu 10%

b, vodu

c, destilovanou vodu

d, fyziologický roztok

11. Použitou jehlu vhodím do:

a, odpadkového koše

b, koše na komunální odpad

c, kontejneru na biologický odpad

d, emitní misky

12. I.d. aplikací se vpravuje do organismu:

a, 10-20ml léčebné látky

b, malé množství léčiva, očkovací látky

c, kontrastní látka

d, větší množství léčiva

13. Intradermální injekce je:

a, zkratka i.d., vpravení léčebné látky pod kůži

b, zkratka i.d., vpravení léčebné látky do kůže

c, zkratka s.c., vpravení léčebné látky pod kůži

d, zkratka s.c., vpravení léčebné látky do kůže

14. I.d. injekce se aplikuje:

a, do vypnuté kůže, pod úhlem 15 stupňů

b, do vypnuté kůže, pod úhlem 45 stupňů

c, do řasy, pod úhlem 15 stupňů

d, do řasy, pod úhlem 45 stupňů

15. Místem aplikace i.d.injekce je nejčastěji:

a, vnější a vnitřní strana předloktí

b, okolí pupku

c, hýžděový sval

d, horní plocha stehna

VYHODNOCENÍ TESTU Č.8

- 1.b
- 2.b
- 3.a
- 4.d
- 5.d
- 6.c
- 7.a
- 8.c
- 9.b
- 10.d
- 11.c
- 12.b
- 13.b
- 14.a
- 15.a

Název školy: **SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou**

Číslo projektu: **CZ.1.07/1.5.00/34.0328**

Název materiálu: **Podávání léků**

Vyučovací předmět: **Ošetrovatelství**

Datum tvorby: **2012/2013**

Autor: **Mgr. Iva Holemářová**