



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní list č. 9

TEST: Podávání léků - aplikace subkutánních injekcí

1. Subkutánní injekce je:

- a, zkratka i.v. , vpravení léku do žíly
- b, zkratka s.c., vpravení léku do kůže
- c, zkratka s.c., vpravení léku pod kůži
- d, zkratka s.k., vpravení léku mezi kůží a podkoží

2. Účinek s.c. injekce nastává:

- a, do 10 minut
- b, za 10-20 minut
- c, za 30 minut
- d, za 1 hodinu

3. Účinek s.c. injekce je:

- a, preventivní
- b, diagnostický
- c, léčebný
- d, profylaktický

4. Mezi místa aplikace s.c. injekcí nepatří:

- a, zevní strana paže
- b, zevní strana stehna
- c, oblast břicha
- d, vnitřní strana stehna

5. Nejlépe se s.c. lék vstřebává z oblasti:

- a, paže
- b, břicha
- c, stehna
- d, hýždě

6. Mezi nejčastější komplikaci při podání s.c. injekcí patří:

- a, napíchnutí cévy
- b, napíchnutí nervu
- c, napíchnutí kosti
- d, aplikace do kůže

7. Lipodystrofie znamená:

- a, ztráta svalové hmoty v místě, kde se opakovaně podávají léky
- b, ztráta tukové hmoty v místě, kde se opakovaně podávají léky
- c, zbytnění tkáně při opakované aplikaci léku
- d, nárůst tukové hmoty při opakované aplikaci léku

8. Nejčastěji se subkutánně aplikují léky:

- a, očkovací látky
- b, antibiotika

- c, inzulíny
- d, hormonální léky

9. Heparin se aplikuje:

- a, do kůže
- b, pod kůži
- c, do svalu
- d, ústy

10. Mezi antikoagulantia, které se aplikují s.c. patří:

- a, Warfarin
- b, Lawarin
- c, Clexane
- d, inzulin

11. Aspirace při aplikaci injekce znamená:

- a, natažení léku do stříkačky
- b, aplikace léku s.c.
- c, ošetření místa vpichu
- d, kontrola, zda není napíchnutá céva

12. Hematomy po aplikaci antikoagulantů ošetřím:

- a, chlazením
- b, sterilním krytím
- c, použitím protizánětlivé masti
- d, dezinfekcí

13. K s.c. aplikaci používám:

- a, inzulinku, 1-2ml stříkačku
- b, 5-10 ml stříkačku
- c, 10-20 ml stříkačku
- d, Janetovu stříkačku

14. Pokud s.c budu aplikovat lék v předplněné stříkačce:

- a, aplikuji kolmo, do řasy a neaspiruji
- b, aplikuji kolmo, do řasy a aspiruji
- c, aplikuji do vypnuté kůže
- d, aplikuji do vypnuté kůže a neaspiruji

15. Lze lék, který je určen k s.c. aplikaci aplikovat jiným způsobem?

- a, ano
- b, ano, ale jen u drahých léků
- c, ne
- d, záleží na stavu pacienta

VYHODNOCENÍ TESTU Č.9

- 1.c
- 2.b
- 3.c
- 4.d
- 5.b
- 6.a
- 7.b
- 8.c
- 9.b
- 10.c
- 11.d
- 12.c
- 13.a
- 14.a
- 15.c

Název školy: **SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou**

Číslo projektu: **CZ.1.07/1.5.00/34.0328**

Název materiálu: **Podávání léků**

Vyučovací předmět: **Ošetřovatelství**

Datum tvorby: **2012/2013**

Autor: **Mgr. Iva Holemářová**