



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POMOC PRO TEBE

CZ.1.07/1.5.00/34.0339

Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav

Označení Název	VY_32_INOVACE_OSEC-16 Pracovní list – Odběry a vyšetření stolice
Anotace	Pracovní list slouží žákům k procvičení odborné terminologie, k ujasnění souvislostí mezi pojmy v rámci jednotlivých laboratorních vyšetření stolice a také k pochopení vztahů mezi diagnostickou dietou a příslušným rozbohem biologického materiálu. Materiál je možné využít ke klasifikovanému prověření znalostí i k domácí přípravě.
Autor	Mgr. Hana Ciprysová
Jazyk	čeština
Klíčová slova	meléna, enterorágie, obstipace, diarhoe, steatorea, acholická stolice, okultní krvácení, výtěr z konečníku, perianální stěr, Hemocult
Cílová skupina	žáci
Stupeň vzdělávání	středoškolské odborné vzdělávání
Studijní obor	Zdravotnický asistent



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní list – odběry a vyšetření stolice

ZADÁNÍ

1. Doplňte následující pojmy do textu ve správném mluvnickém tvaru:

hemoroidy, enteroragie, karcinom střev, enteritis, steatorea, obstipace, tužkovitá, diarhoe, pohled, obstrukce, meléna, páchnoucí, acholická, natrávená, malabsorpční

Fyzikální vyšetření stolice představuje zhodnocenía čichem.

Světle šedá stolice se označuje jakoa je projevem

.....žlučových cest. Vodnatá, silněstolice provází

infekční zánět střevní sliznice – odborně nazývaný jako infekční

Příznakem krvácení v horní části GIT je - černá dehtovitá

stolice skrví. Objemná, světlá a lesklá stolice, která provází

.....syndrom, se nazýváTuhá stolice je projevem

....., naopak častá řídká stolice je projevem

Stolice s příměsí čerstvé krve se označuje jakoa je

příznakemnebo.....Na stenózu střev

upozorňuje.....stolice.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2. Do tabulky doplňte uvedené pojmy tak, aby byla mezi pojmy v barevně označeném řádku souvislost:

*Hemocult, výtěr z konečníku, perianální stěr, vyšetření na zbytky,
Schuffnerova tyčinka, činnost GIT, dieta na OK, bakteriologické vyšetření*

skryté krvácení		
	roupy	
		sterilní štětička s živnou půdou
Schmidtova dieta		

3. Testové otázky – podtrhněte všechny správné odpovědi (možnost více správných odpovědí v jedné otázce)

- **Které potraviny je nutné vyřadit z jídelníčku při dietě na OK?**

- a) brambory a rýži
- b) maso a rajčata
- c) banány
- d) chléb a bílé pečivo
- e) minerální vody



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- ***Které léky mohou zkreslit výsledek mikrobiologického vyšetření stolice?***
 - a) Penicilin
 - b) Digoxin
 - c) Biseptol
 - d) Carbosorb
 - e) Furosemid

- ***Kdy provádíme perianální stěr?***
 - a) po důkladné toaletě
 - b) ráno před umytím
 - c) večer po jídle
 - d) kdykoli
 - e) při podezření na parazitární nákazu

- ***K odběru stolice na vyšetření se nepoužívá:***
 - a) emitní miska
 - b) plastová nádobka k jednomu použití
 - c) odběrovka s protisrážlivým prostředkem
 - d) sterilní štětka s živnou půdou
 - e) širokohrdlá zkumavka s lopatkou




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní list – odběry a vyšetření stolice

ŘEŠENÍ

1. Doplňte následující pojmy do textu ve správném mluvnickém tvaru:

Fyzikální vyšetření stolice představuje zhodnocení **pohledem** a čichem. Světle šedá stolice se označuje jako **acholická** a je projevem **obstrukce** žlučových cest. Vodnatá, silně **páchnoucí** stolice provází infekční zánět střešní sliznice – odborně nazývaný jako infekční **enteritis**. Příznakem krvácení v horní části GIT je **meléna** - černá dehtovitá stolice s **natrávenou** krví. Objemná, světlá a lesklá stolice, která provází **malabsorpční** syndrom, se nazývá **steatorea**. Tuhá stolice je projevem **obstipace**, naopak častá řídká stolice je projevem **diarhoe**. Stolice s příměsí čerstvé krve se označuje jako **enterorágie** a je příznakem **hemoroidů** nebo **karcinomu střev**. Na stenózu střev upozorňuje **tužkovitá** stolice.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2. Do tabulky doplňte uvedené pojmy tak, aby byla mezi nimi v řádku souvislost:

*Hemocult, výtěr z konečníku, perianální stěr, vyšetření na zbytky,
Schuffnerova tyčinka, činnost GIT, dieta na OK, bakteriologické vyšetření*

skryté krvácení	Hemocult	dieta na OK
Schuffnerova tyčinka	roupy	perianální stěr
bakteriologické vyšetření	výtěr z konečníku	sterilní štětička s živnou půdou
Schmidtova dieta	vyšetření na zbytky	činnost GIT




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

3. Testové otázky – podtrhněte všechny správné odpovědi

(možnost více správných odpovědí v jedné otázce)

- ***Které potraviny je nutné vyřadit z jídelníčku při dietě na OK?***
 - a) brambory a rýži
 - b) maso a rajčata
 - c) banány
 - d) chléb a bílé pečivo
 - e) minerální vody

- ***Které léky mohou zkreslit výsledek mikrobiologického vyšetření stolice?***
 - a) Penicilin
 - b) Digoxin
 - c) Biseptol
 - d) Carbosorb
 - e) Furosemid

- ***Kdy provádíme perianální střer?***
 - a) po důkladné toaletě
 - b) ráno před umytím
 - c) večer po jídle
 - d) kdykoli
 - e) při podezření na parazitární nákazu



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- ***K odběru stolice na vyšetření se nepoužívá:***
 - a) emitní miska
 - b) plastová nádobka k jednomu použití
 - c) odběrovka s protisrážlivým prostředkem
 - d) sterilní štětka s živnou půdou
 - e) širokohrdlá zkumavka s lopatkou